

### ការគ្រប់គ្រងសត្វកកេរក្នុងពេលទុកដាក់

Management of Rodents in Storage

#### ការបំផ្លាញទៅលើសំភារៈនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗ Damage to material and equipment

ពពួកសត្វកកេរវាបំផ្លាញ តង់កៅស៊ូ កាប៉ុង ឈើទំរ ប្រដាប់បាញ់ទឹក រួមទាំងឃ្នាំងផងដែរ (ខ្សែរពួរឬខ្សែរភ្លើង ទ្វារ....) ។  
ប្រការនេះ ជាញឹកញាប់បណ្តាលអោយមានការខូចខាត ដូចខាងក្រោម :

- ផលិតផលឆ្កាយចេញពីកាប៉ុង ឬសំភារៈរេចខ្ទប់
- គំនរហ្វូដូលរលំ
- ធ្វើអោយចេញផ្កាភ្លើង ឬភ្លើង ពីកន្លែងដែលខ្សែរភ្លើងប៉ះគ្នា
- ស៊ីឡូ ឬឃ្នាំងស្តុកអាចស្រុតចុះ ឬដួលរលំ ដែលជាលទ្ធផលនៃការទំលាយចោល
- បំផ្លាញប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកជុំវិញឃ្នាំង

#### វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង Management Options

វិធានការណ៍ការពារ Preventive measures

កត្តាសំខាន់បំផុត ក្នុងការកកើតសត្វកកេរគឺ :

- ការផ្គត់ផ្គង់អាហារគ្រប់គ្រាន់
- កន្លែងការពារដែលត្រូវធ្វើរន្ធនិងសំបុក
- កន្តកកន្ទៀតដែលអាចជ្រក ឬពូនបាន
- មានច្រកដែលអាចអោយវាចេញចូលទៅក្នុងឃ្នាំងផលិតផលបាន (Access to produce)

ការគ្រប់គ្រងឃ្នាំងត្រឹមត្រូវ និងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់បានល្អ គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងចម្រុះ (Integrated control program) ដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបាន ។

ការរក្សាសត្វកកេរអោយនៅខាងក្រៅឃ្នាំង Keeping the rodents out

តម្រូវការផ្សេងៗក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ឬការពារ ពពួកសត្វកកេរ ត្រូវតែយកមកពិចារណានៅពេលណាដែលយើងសាងសង់អាគារ ឬឃ្នាំងថ្មី ជាពិសេសទៅលើ ទ្វារ ប្រឡោះខ្យល់ចេញចូល កន្លែងធ្វើពិតដួ ផ្លូវ ឬកន្លែងប្រសព្វគ្នារវាងដំបូលនិងជញ្ជាំងជាដើម ។ ជួសជុលយ៉ាងឆាប់រហ័សកន្លែងដែលខូច ជាពិសេសទ្វារ ។

អនាម័យ និងវិធានការបច្ចេកទេសក្នុងការទុកដាក់ Storage hygiene and technical measures

- រក្សាឃ្នាំងអោយនៅស្អាតរហូត ហើយប្រមូលគ្រាប់ស្រូវដែលជ្រុះកំពាប់ ខ្នាតខ្លាយ ចេញយ៉ាងឆាប់រហ័ស
- កាប៉ុង ឬហ្វូស្រូវ ត្រូវរៀបជាគំនរយ៉ាងមានសណ្តាប់ធ្នាប់នៅលើឈើទំរ ឬប៉ាឡែត ដោយប្រាកដថាវាមានចន្លោះ ១ ម៉ែត្រ ពីគំនរមួយទៅគំនរមួយទៀត ។
- ទុកដាក់កាប៉ុង ឬហ្វូស្រូវ ឬកាប៉ុងទេ និងបាញ់ថ្នាំកំរាលលើឈើទំរ ហើយបើសិនជាអាចធ្វើបានគួរតែធ្វើនៅបន្ទប់មួយដាច់ដោយឡែកពីគេ ។
- រក្សាឃ្នាំងអោយនៅស្អាតនិងមិនមានសំរាម ដើម្បីកុំអោយសត្វផ្សេងៗមានកន្លែងពូន ឬធ្វើសំបុកបាន ។
- រក្សាបរិដ្ឋានជុំវិញឃ្នាំងអោយស្អាតល្អ មិនមានស្មៅដុះខ្ពស់ៗដែលអាចអោយសត្វពូនបាន ។
- រក្សាបរិដ្ឋានជិតឃ្នាំងអោយស្អាតល្អ មិនមានទឹកដក់ឬទឹកស្អុយ ហើយធានាថាទឹកភ្លៀងត្រូវបានបង្ហូរទៅឆ្ងាយ ។