



ឃ្លាំងចំណេះដឹងស្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជា

Cambodian Rice Knowledge Bank

ពូជស្រូវកណ្តាល “ខា ៣”

ពូជស្រូវ “ខា ៣” ជាពូជស្រូវកណ្តាលដែលបានធ្វើការរំដោះ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នាឆ្នាំ ១៩៩៥។ បច្ចុប្បន្នពូជស្រូវកណ្តាលបាន និងកំពុងពេញនិយមក្នុងចំណោមប្រជាកសិករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយពូជស្រូវ នេះផ្តល់នូវទិន្នផលខ្ពស់ និងបាយទន់ឆ្ងាញ់។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ពូជស្រូវ “ខា ៣”

ពូជស្រូវ “ខា ៣” ជាពូជស្រូវដែលមានវេទរសភាពនឹងរយៈពេល (ប្រកាន់រដូវ) និងចាប់ចេញផ្កាក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ទៅដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា អាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុ និងពេលវេលាដាំដុះ។ កំពស់ដើមរបស់ពូជ “ខា ៣” ប្រែប្រួលពី ១២០-១៧០ ស.ម និងចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល គឺចាប់ពី ៧-១០ ដើម ក្នុងមួយគុម្ព អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទដី។ ចំនួនគ្រាប់ក្នុងមួយកូរ មានចាប់ពី ១០០-១៥០ គ្រាប់ និងមានប្រវែងកូរ ២០-២៥ ស.ម។ រីឯទិន្នផល របស់វាវិញ គឺអាចទទួលបានចាប់ពី ២.៥ តោន ទៅ ៤.៥ តោនក្នុងផ្ទៃដី ១ ហិកតា។ ពូជស្រូវ “ខា ៣” គឺជាពូជដែលធន់ទ្រាំមធ្យមទៅនឹងភាពរាំងស្ងួត តែមិនធន់ទៅនឹងមមាចត្នោតទេ។



វិនិស្ស័យដំដុះ

សម្រាប់ស្រូវសន្ទូង ចំពោះតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ បរិមាណគ្រាប់ពូជដែលប្រើប្រាស់គឺពី ៦០-៨០ គីឡូក្រាម ក្នុងមួយហិកតា។ ចំពោះតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងទឹកបាន បរិមាណគ្រាប់ពូជដែលប្រើប្រាស់គឺពី ៣០-៤០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតា។ ក្នុងករណី ដែលគ្រាប់ពូជសុទ្ធ និងមានសុខភាពល្អ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងទឹកបាន និងថែទាំបានល្អ បរិមាណគ្រាប់ពូជដែលត្រូវការក្នុងមួយហិកតាគឺពី ១៥- ២០ គីឡូក្រាម។ ដើម្បីឱ្យសំណាបដុះលូតលាស់ធំធាត់ល្អ គេត្រូវសាបគ្រាប់ពូជមួយគីឡូក្រាមលើផ្ទៃដីផ្ទាល់ ១០ ម៉ែត្រការ៉េ។ ទីសំណាបត្រូវ ធ្វើនៅជិតប្រភពទឹក តែត្រូវឆ្ងាយពីម្លប់ព្រៃ ឬកន្លែងមានភ្លើងអគ្គិសនី ដើម្បីជៀសវាងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃ។ ជាការល្អ គួរស្ទង់សំណាប ដែលមានអាយុ ២៥-៣០ ថ្ងៃ ហើយក្នុងមួយគុម្ពចំនួន ២-៣ ដើម។ សម្រាប់ស្រូវពង្រួស ចំពោះតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះរាំងស្ងួត និងទឹក ជំនន់ បរិមាណគ្រាប់ពូជដែលប្រើប្រាស់គឺពី ១០០-១៥០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតា។ ចំពោះតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងទឹកបាន និងគ្រាប់ពូជសុទ្ធ ល្អ បរិមាណគ្រាប់ពូជដែលប្រើប្រាស់គឺពី ៧០-៨០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតា។ គួររៀបចំដីឱ្យបានល្អ និងរាបស្មើមុនស្ទង់ ឬប្រួសបាន។ ការភ្ជួររាស់ គួរតែធ្វើឱ្យបាន ២-៣ សារជាការល្អប្រសើរ។ បើសិនស្រែអាចបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកបានបន្ទាប់ពីស្ទង់ ឬប្រួសបាន ២០ ថ្ងៃអាចបញ្ចេញទឹក ឱ្យអស់ពីក្នុងស្រែ ២-៤ ថ្ងៃចេញទឹកថ្មីវិញ។ ធ្វើរបៀបនេះ គឺដើម្បីធ្វើឱ្យស្រូវកាន់តែបែកគុម្ពល្អ។ ប៉ុន្តែពេលស្រូវបែក គុម្ពអតិបរិមា គួរបង្ហូរទឹករយៈពេលមួយអាទិត្យ ដើម្បីកុំឱ្យស្រូវដុះខ្ពង់មកច្រើនទៀត។

ការប្រើប្រាស់ដី

ការប្រើប្រាស់ដីសមស្របតាមកម្រិតណែនាំ នឹងមិនបណ្តាលអោយមានការថយចុះ ឬបាត់បង់ក្លិន ឬគុណភាពដទៃទៀតឡើយ ។ គួរដាក់ដី ២-៣ ដងក្នុង ១ វដ្តជីវិតរបស់ស្រូវដោយ:

- **បាចលើកទី១:** ទ្រាប់បាចមុនពេលស្ទូង ប្រើដីធ្មជាតិពី ៥-១០ តោន/ហត និងរួមផ្សំជាមួយជីគីមីដូចមានក្នុងតារាងទី ១ ។ សម្រាប់ពេលវេលានៃការបាចដីបំប៉នលើកទីមួយ និងលើកទីពីរធ្វើឡើងទៅតាមពេលវេលាសាបដូចមានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងទី ២ ។

តារាងទី ១

ប្រភេទដី	ប្រភេទដី	ទ្រាប់បាច (តក្រ/ហត)	បំប៉ន (តក្រ/ហត)	
			លើកទី១	លើកទី២
ដីខ្សាច់ (ដីព្រៃខ្មែរ ប្រទេសឡាវ)	អ៊ុយរ៉េ	១៦	៣៥	២៦
	ដេអាប៊េ	២៦	០	០
	ប៊ូតាស	១០០	០	០
ដីល្បាយឥដ្ឋ (ដីបាកាន អូរូង ទួលសំរោង គោកត្រប់ ក្រគរ)	អ៊ុយរ៉េ	២៧	១០៥	៦០
	ដេអាប៊េ	៥៥	០	០
ដីឥដ្ឋ (ដីកំពង់សៀម ក្បាលពោធិ កៀនស្វាយ)	អ៊ុយរ៉េ	៥០	៧០	៥៣
	ដេអាប៊េ	០	០	០



តារាងទី ២

ពេលវេលាសាប	បំប៉នលើកទីមួយ	បំប៉នលើកទីពីរ
១-៣១ មិថុនា	៣០ថ្ងៃ ក្រោយស្ទូង	២៦-២៩ កញ្ញា
១-១៥ កក្កដា	៣០ថ្ងៃ ក្រោយស្ទូង	៣០ កញ្ញា -២ តុលា
១៦-៣០ កក្កដា	៣០ថ្ងៃ ក្រោយស្ទូង	៣ -៦ តុលា

ការប្រមូលដល់ និងទុកដាក់

- ត្រូវធ្វើការច្រូតកាត់នៅរវាង ៣០-៣៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីស្រូវហាលផ្កាស្រុះ ឬពេលដែលប្រមាណ ៨៥ ភាគរយនៃគ្រាប់ស្រូវរំទុំ ។
- ត្រូវហាល ២-៣ ថ្ងៃ ដើម្បីបន្ថយសំណើមនៅក្នុងគ្រាប់ឱ្យនៅ ១៤ ភាគរយ មុននឹងទុកជាការល្អ ។ សូមយកគ្រាប់ស្រូវមកខាំដើម្បីកំណត់បើគ្រាប់ស្រូវនោះបាក់ គឺមានន័យថាគ្រាប់ស្រូវស្ងួតល្អអាចទុកដាក់បាន ។
- គ្រាប់ពូជ ត្រូវច្រកទុកនៅក្នុងបារក្របោដាច់ដោយឡែកពីគ្រាប់ស្រូវចំណី នៅកន្លែងដែលស្ងួតល្អ ហើយគ្មានការបំផ្លាញពីសត្វកណ្តុរ មាន់ ទា ជាដើម ។ ត្រូវសរសេរឈ្មោះពូជ និងថ្ងៃខែច្រូតកាត់ដាក់នៅលើបារឱ្យបានត្រឹមត្រូវល្អ ។
- គ្រាប់ស្រូវចំណីត្រូវទុកដាក់ក្នុងជង្រុកឱ្យបានល្អ ដោយការពារកុំឱ្យសត្វកណ្តុរ មាន់ ទា ចូលស៊ី និងមិនឱ្យទទឹក ។

