



ពូជស្រូវក្រអូប “ផ្ការំចេក”

ពូជ “ផ្ការំចេក” ជាពូជស្រូវក្រអូបដែលបានធ្វើការរំដោះ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជានាឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ បច្ចុប្បន្នពូជស្រូវ “ផ្ការំចេក” បាននឹងកំពុងពេញនិយមក្នុងចំណោមប្រជាកសិករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយពូជស្រូវនេះផ្តល់នូវទិន្នផលខ្ពស់ គុណភាពអង្ករល្អមានភាពថ្លាវៃវែងរលូន បាយទន់ឆ្ងាញ់ថែមទាំងមានក្លិនក្រអូបទៀតផង ។ ជាពិសេសទៅទៀត ជាពូជដែលមានប្រភេទអង្ករមានតំលៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ ។

លក្ខណៈពិសេសៗរបស់ពូជស្រូវផ្ការំចេក

ពូជ “ផ្ការំចេក” ជាពូជស្រូវដែលមាន វេទសភាពនឹងខូបពន្លឺ “ប្រកាន់ដូរ” មធ្យម ។ វាចាប់ចេញផ្កាពីចុងខែតុលា អាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុ និងពេលវេលាដាំដុះ ។ កំពស់ដើមរបស់ពូជស្រូវ “ផ្ការំចេក” ប្រែប្រួលពី ១១២-១៦៣ ស.ម និងចំនួនដើមបែកគឺចាប់ពី ៥-១០ ដើម ក្នុងមួយគុម្ព អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទដី ។ ចំនួនគ្រាប់ក្នុងមួយកូរមានចាប់ពី ១០៦-១៤៦ គ្រាប់ និងមានប្រវែងកូរ ១៦-២៨ ស.ម ។ រីឯទិន្នផលរបស់វាវិញគឺអាចទទួលបានចាប់ពី ៣.០ តោន ទៅ ៥.០ តោន ក្នុងផ្ទៃដី ១ ហិកតា ។

វិធីសាស្ត្រដាំដុះ

- ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជដែលសុទ្ធជា និងមានអត្រាដំណុះខ្ពស់ ។
- បរិមាណគ្រាប់ពូជចាំបាច់ ៣០-៥០ គ.ក្រ ក្នុង ១ ហិកតា សំរាប់ស្រូវសន្លុង និង ៨០-១២០ គ.ក្រ ក្នុង ១ ហិកតា សំរាប់ស្រូវពង្រស ។
- ទីសំណាប់ត្រូវធ្វើនៅជិតប្រភពទឹក តែត្រូវឆ្ងាយពីម្លប់ព្រៃ ឬ កន្លែងមានភ្លើងអគ្គិសនី ដើម្បីចៀសវាងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃ ។
- ផ្ទៃដីសំរាប់សាបគឺ ១ គីឡូក្រាម ក្នុងផ្ទៃដី ១៥-២០ ម៉ែត្រការ៉េ ។
- ជាការល្អគួរស្ទង់សំណាប់ដែលមានអាយុ ២៥-៣០ ថ្ងៃ ហើយក្នុង ១គុម្ព ២-៣ ដើម ។
- គួររៀបចំដីអោយបានល្អមុនស្ទង់ ។ ការភ្ជួររាស់ គួរតែធ្វើអោយបាន ២-៣សារ ជាការល្អ ។

⊙ បើសិនស្រែយើងអាចបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកបាន ពេលស្រូវបែកគុម្ពត្រូវបញ្ចេញទឹកអោយអស់ពីក្នុងស្រែ ២-៤ថ្ងៃ រួចបញ្ចូលទឹកថ្មីវិញ ។ នេះគឺដើម្បីធ្វើអោយស្រូវកាន់តែបែកគុម្ពល្អ ។



